

**HELM**

CALFIT®

Fertilizante Mineral Misto

Garantias:	P/P	P/V
Ca (Total)	10,2 %	135,15 g/mL
Zn (solúvel em H ₂ O)	0,2 %	2,65 g/mL
Mn (solúvel em H ₂ O)	0,2 %	2,65 g/mL

Componentes: Fosfito de Cálcio, Quelato de Zinco, Quelato de Manganês, Agente complexante L-aminoácidos, 10,8% anti cristalizante, 4% dispersante, 0,1% estabilizante, 0,2% espessante, 0,2% anti evaporante, água.

Especificação de Natureza Física: Fluido - Suspensão

Densidade: 1,325 g.mL⁻¹

“PRODUTO IMPORTADO”

AGITE ANTES DE USAR

FABRICADO POR:
AGROSMART LTD.

Unit 1C, Victoria Court, Colliers Way, Clayton West,
Huddersfield, West Yorkshire, HD8 9TR, Reino Unido

IMPORTADO POR:
HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA.

Avenida Constante Pavan, nº 4633, Armazém 1D,
Betel, Paulínia/SP - CEP: 13148-198
CNPJ: 47.176.755/0008-81 - www.helmcrop.com.br
Registro no MAPA: SP 005701-0.000011
Registro de estabelecimento Nº EI: 005700-2

CONTEÚDO: 10 litros



ATENÇÃO

H319: Provoca irritação ocular grave.

TRANSPORTE

Produto não enquadrado na portaria em vigor sobre transporte de produtos perigosos.

ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto em áreas frescas, secas, cobertas e ventiladas, longe do calor e alimentos, evitando contato direto com o solo e outros produtos. Armazenar fora do alcance de crianças e de animais. Manter fechada a embalagem ainda com o produto.

Data de fabricação:	VIDE EMBALAGEM
Lote:	
Quantidade produzida:	

Validade 2 anos após a data de fabricação.

ATENÇÃO

LEIA O RÓTULO.

Para recomendações adicionais ou em caso de dúvidas, consulte o Departamento Técnico da HELM através do formulário de contato no site www.helmcrop.com.br

Telefones de emergência:

Emergências Toxicológicas 0800 7010 450 (24 horas)

Emergências para Transportes 0800 117 2020 (24 horas)

SOBRE O PRODUTO

Calfit® é um fertilizante contendo cálcio, zinco e manganês, sendo um produto essencial para os processos de crescimento da planta, floração, desenvolvimento da cultura, qualidade da colheita, rendimento, enraizamento e desenvolvimento radicular.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Usar **Calfit®** conforme as instruções deste rótulo.

Agite antes de usar.

O volume de água a ser utilizado nas pulverizações depende do estágio de desenvolvimento da cultura e dos equipamentos disponíveis para as aplicações.

CULTURAS	DOSE	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
GRANDES CULTURAS		
Café	1,0 - 1,5 L.ha ⁻¹	Até 5 aplicações com intervalos de 30 dias durante o ciclo da cultura.
Feijão	0,5 - 1,0 L.ha ⁻¹	Até 2 aplicações durante o ciclo da cultura.
Soja	0,5 - 1,0 L.ha ⁻¹	Até 2 aplicações durante o ciclo da cultura. 1ª aplicação no estágio V4-V5; 2ª aplicação no início do florescimento (R1-R2).
FRUTAS		
Citros, abacate, manga e outras frutas de árvore	1,0 - 2,0 L.ha ⁻¹	Até 8 aplicações com intervalos de 21 dias durante o ciclo da cultura.
Maçã	200 - 300 mL.100 L ⁻¹ 2,0 - 3,0 L.ha ⁻¹	Até 8 aplicações com intervalos de 7 a 10 dias durante o ciclo da cultura.
Uva	1,0 - 2,0 L.ha ⁻¹	Até 6 aplicações com intervalos de 15 dias durante o ciclo da cultura.
HORTALIÇAS		
Batata, batata-doce e outros tubérculos	1,0 - 2,0 L.ha ⁻¹	3 aplicações durante o ciclo da cultura. 1ª aplicação na amontoa (estádio V1-V2); 2ª aplicação na formação do estolão; 3ª aplicação durante a fase de crescimento dos tubérculos.
Melão e outras curcubitáceas	1,0 - 2,0 L.ha ⁻¹	Aplicar após o transplante; repetir a aplicação a cada 15 dias.
Tomate, pimentão e outras solanáceas	200 - 300 mL.100 L ⁻¹ 1,0 - 2,0 L.ha ⁻¹	4 a 5 aplicações ao longo do ciclo, sendo a 1ª aplicação 5 a 7 dias após o transplantio; repetir a aplicação a cada 21 dias.

Maior relação soluto/solvente: 7,5 mL.L⁻¹

Modo de Aplicação: Via Foliar

PRECAUÇÕES

Evitar aplicar o produto nos horários de temperaturas mais elevadas e/ou com baixo teor de umidade relativa do ar e/ou ventos fortes.

Sempre utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI).